



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“**Enrico Mattei**”

Professionale RMRC05701V  
Liceo RMPS05701A  
Tecnico RMTD057016

RMIS05700X - Distretto 30°  
Via Settevene Palo Nuova snc  
00052 CERVETERI (RM)  
c.f. 91038340583  
[www.enricomattei.edu.it](http://www.enricomattei.edu.it)

Tel. **06.121128265**  
**06.121128266**  
[RMIS05700X@istruzione.it](mailto:RMIS05700X@istruzione.it)  
[RMRC057507@istruzione.it](mailto:RMRC057507@istruzione.it)  
[RMIS05700X@pec.istruzione.it](mailto:RMIS05700X@pec.istruzione.it)

Circolare N. 9

Cerveteri, 14/09/2023

Ai Docenti  
Agli studenti e alle loro famiglie  
Al personale ATA  
Al DSGA

**Oggetto: Segnalazione recente caso di scabbia**

Si comunica che l'ufficio SISP Asl Roma 4 ha segnalato un caso di scabbia che, dall'indagine epidemiologica, riguarda uno studente frequentante il nostro Istituto.

Si invita tutto il personale scolastico, gli studenti e le famiglie ad effettuare un controllo, in collaborazione con i medici curanti, in caso di comparsa di manifestazioni cutanee o prurito.

Si trasmette in allegato la nota informativa dell'Asl.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Prof. Roberto Mondelli)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93

**Descrizione:** è un'infestazione dovuta ad un acaro parassita *Sarcoptes Scabiei*.

**Ciclo evolutivo:** Si compie nell'uomo, dopo l'accoppiamento il maschio adulto rimane sulla cute, mentre la femmina depone le uova sotto la superficie cutanea, dove vive in genere 30 giorni.

Dalle uova hanno origine le larve che emergono dopo 3-4 gg ed invadono la cute circostante.

L'acaro riesce a vivere fino a 1 o 2 mesi se è a contatto con l'essere umano o con animale a sangue caldo, ma non sopravvive più di 48-72 h se lontano dall'uomo.

**Trasmissione:** La fonte più comune è il contatto prolungato diretto cute-cute con un individuo infestato ed occorrono dai 15 ai 20 minuti di contatto perché si verifichi la trasmissione.

Raramente avviene per contatto indiretto cute-biancheria, biancheria intima, lenzuola, ect., che sono stati contaminati da poco dal malato.

**Incubazione:** Da 2 a 6 settimane in caso di persone non esposte in precedenza dal contatto con la persona infetta; invece da 1 a 4 giorni in caso di reinfezione, ovvero chi in passato si era già ammalato di scabbia.

**Contagiosità:** Fino a che gli acari e le uova non sono stati distrutti dal trattamento.

Possono essere necessari 2 o più cicli di trattamenti eseguiti ad intervalli di 1 settimana.

**Segni e Sintomi:** Prurito intenso che si manifesta soprattutto di notte, che impedisce di dormire.

La cute appare arrossata per presenza di cunicoli di 2-5 mm di lunghezza, prevalentemente a livello degli spazi tra le dita, sui polsi e sui gomiti, ma possono essere presenti anche sui piedi, caviglie, genitali maschili, nell'areola mammaria femminile e sul palmo delle mani.

Nei bambini si presenta sottoforma di vescicole ed interessa il volto, la testa, il collo, il cuoio capelluto, piante dei piedi e la zona retro-auricolare.

**Raccomandazioni:** Se compaiono i sintomi e segni sopra descritti contattare il proprio medico di base, per un'accurata visita dermatologica. Qualora venga fatta diagnosi di scabbia, è necessario:

- Allontanamento della persona da scuola o dal lavoro fino al giorno successivo a quello di inizio della cura specifica;
- Lenzuola, coperte e vestiti lavati con acqua a temperatura di 60 °C e stiratura con ferro ben caldo;
- Porre in un sacco impermeabile tutto ciò che non è lavabile ad alte temperature (oggetti, coperte, cuscini, capi in lana), lasciato chiuso per almeno 72 ore e poi esporlo all'aria (l'acaro non può sopravvivere a lungo lontano dalla pelle umana);
- I locali, i tappeti e mobili imbottiti utilizzati da un soggetto affetto da scabbia devono essere puliti ed aspirati dopo l'uso, e il sacchetto dell'aspirapolvere va immediatamente smaltito
- I materassi e gli ambienti domestici vanno disinfettati con strumenti a getto di vapore.
- Sostituire la biancheria personale, le lenzuola, le federe e gli asciugamani della persona affetta da scabbia dopo ogni trattamento di applicazione della crema cutanea.